

Pie diabético en joven trabajador

Sainz F⁽¹⁾, Alonso N⁽²⁾, Abdelkader A⁽³⁾, Peraza J⁽⁴⁾, Brita-Paja C⁽⁵⁾

⁽¹⁾Médico especialista en Medicina del Trabajo

⁽²⁾Especialista en Angiología y Cirugía Vascular

⁽³⁾Especialista en Angiología y Cirugía Vascular

⁽⁴⁾Especialista en Angiología y Cirugía Vascular

⁽⁵⁾Especialista en Medicina del Trabajo

Correspondencia:

Felipe Sainz

Hospital Central de la Defensa Gómez-Ulla.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.

c/ Glorieta del Ejército s/n, Madrid.

Correo Electrónico: sainz.felipe@gmail.com

La cita de este artículo es: F Sainz et al. Pie diabético en joven trabajador.

Rev Asoc Esp Espec Med Trab 2015; 24: 130-133.

Resumen: El pie diabético viene determinado por la neuropatía que se produce en el paciente con diabetes y el traumatismo sobre el pie con la microangiopatía propia de la diabetes asociada o no a la macroangiopatía. Presentamos un paciente joven con mal control de la glucemia y de la lesión trófica que pudo conservar la funcionalidad de la extremidad con un tratamiento adecuado.

Palabras Clave: pie diabético, prevención, tratamiento precoz

DIABÉTICO FOTO INA YOUNG WORKER.

ABSTRACT

The diabetic foot is determined by the result of a peripheral neuropathy that evolves with high blood sugar levels over a long time, together with macrotraumatism over the feet in a diabetic foot already affected with microangiopathy. A macroangiopathy might be also involved.

We present the case of a young patient with high blood sugar levels and a diabetic ulcer, who was able to preserve the function of his foot after a correct treatment.

Key-words: diabetic foot, prevention, early treatment

Fecha de recepción: 7 de septiembre de 2015

Fecha de aceptación: 15 de septiembre de 2015